INSECTOS DESCORTEZADORES

Plaga de importancia nacional, siendo el segundo agente, después de los incendios forestales, de mayor disturbio en bosques de clima templado en México, por la magnitud de superficie afectada y cantidad de arbolado dañado.

Características generales

Los descortezadores son pequeños escarabajos que habitan debajo de la corteza del árbol y se alimentan del tejido que conduce los nutrientes del mismo. La forma del cuerpo varía de robusto a delgado, su longitud oscila desde 2.2 a 9 mm; y su color va desde rojizo, café rojizo, café, hasta el negro.



Evidencia de daños en los hospedantes

- Presencia de grumos de resina o escurrimiento de la misma en el fuste y/o ramas.
- Presencia de desechos, con apariencia de aserrín, en la corteza.
- Cambios de coloración del follaje a verde amarillento o rojizo.
- Presencia de galerías en la parte interna de la corteza.

Hospedantes

Diversas especies de los géneros Pinus, Abies, Cupressus, Juniperus y Pseudotsuga.


















Algunos ejemplos de hospedantes son: Pinos (ocote blanco, ocote chino, pino lacio, pino colorado, pino amarillo, pino blanco, pino real), Abies (oyamel), Cupressus (cedro blanco), Juniperus (táscate y/o enebro), Pseudotsuga (ayarin y/o pinabete).





Alerta Temprana y Evaluación de Riesgo para Insectos Descortezadores Marzo 2019



Alerta Temprana y Evaluación de Riesgo para Insectos Descortezadores Marzo 2019

Análisis:

Tomando como referencia la información de la Serie VI de Uso del Suelo y Vegetación (INEGI, 2017), del Monitor de Seguía en México y del Pronóstico Climático de Temperatura para el mes de marzo de 2019 del Servicio Meteorológico Nacional (CONAGUA, 2019), Incendios Forestales 2018 (CONAFOR, 2018) y el registro de las Notificaciones de saneamiento forestal por afectación de insectos descortezadores emitidas por SEMARNAT (SNGF, 2019) en los años 2015, 2016, 2017 y 2018; se determina que las zonas forestales de los Estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Hidalgo, Querétaro y Tamaulipas presentan un riesgo Muy Alto; mientras que los estados de Puebla, Morelos, México, Tlaxcala, Cd. México, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Durango, Coahuila, Chihuahua y Baja California se consideran con riesgo Alto. Así también, los estados de Veracruz, Colima y Sinaloa presentan áreas con riesgo Moderado. Las Entidades Federativas restantes que tienen vegetación forestal de coníferas se determinan con riesgo Bajo.



